

Die Individualprophylaxe bei Erwachsenen

Der Gesetzgeber fördert besonders die Individualprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen, von der wir in der letzten recall-Ausgabe berichtet haben. Doch wie sehen die Vorbeugemaßnahmen bei Erwachsenen aus?

Text Stefanie Ullmann und Jana Brandt

Schema zur Ermittlung des PSI-Codes

PSI -Code	Sondierungstiefe	Blutungs- neigung	Zahnstein oder Biofilm oder defekte Restaurationsränder	Therapie
0	< 3,5 mm	Keine	Keine	Recall
1	< 3,5 mm	Blutung	Keine	Motivation, Mundhygieneanleitung, Recall
2	< 3,5 mm	Eventuell	Vorhanden	PZR, ggf. Konturierung von Füllungsrändern, Motivation, Mundhygieneanleitung, Recall
3	< 3,5 mm bis < 5,5 mm			Verdacht auf leichte bis mittelschwere Parodontitis, deshalb: - Erhebung eines ausführlichen Parodontalbefundes <ul style="list-style-type: none"> • PZR • Mundhygieneanleitung • Ggf. systematische Parodontitistherapie
4	> 5,5 mm			Verdacht auf mittelschwere bis schwere Parodontitis, deshalb: <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung eines ausführlichen Parodontalbefundes • PZR • Mundhygieneanleitung • Systematische Parodontitistherapie